

Mieszanki nasion traw, ziół i rozchodników

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I METODA SIEWU

W razie potrzeby spulchnić i delikatnie rozgrabić warstwę podłoża, a następnie równomiernie rozsiać nasiona na całej docelowej powierzchni.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby nie wsiewać nasion głęboko do gleby. W przypadku siewu mechanicznego należy ustawić siewnik w pozycji umożliwiającej rozsiewanie nasion tuż nad powierzchnią podłoża.

Po wysiewie ponownie delikatnie rozgrabić oraz dokładnie zwałować całą powierzchnię. Dzięki tym zabiegom nasiona ulegną wystarczającemu zmieszaniu z warstwą podłoża, co zapewni ich prawidłowe wschodzenie. Nasiona wysiane zbyt głęboko będą miały utrudnione warunki wschodzenia, natomiast niektóre gatunki mogą nawet nigdy nie wzejść.

W trudnych warunkach siedliskowych (np. ryzyko erozji, ptaków drapieżnych, ślimaków) lub jeśli istnieje duże ryzyko złej pogody (susza, mróz) zalecane jest przeprowadzenie mulczowania na obszarze całego wysiewu, np. z użyciem ciętej trawy (2 kg/m²) bądź siana lub słomy (0,5 kg/m²).

Zużycie mieszanki siewnej w przypadku siewu suchego wynosi 20-40 g/m².

Najlepszymi miesiącami do wysiewu są okresy od kwietnia do czerwca w porze wiosennej oraz od września do listopada w porze jesiennej.

PIELĘGNACJA PRZEDWEGETACYJNA

Po wysiewie nasiona muszą być utrzymane w stałej wilgotności do czasu wzejścia i ukorzenienia się roślin w podłożu. W przypadku wysiewu w okresie letnim należy pamiętać o regularnym nawadnianiu przez okres około 3 tygodni po wysiewie.

Pierwsze nasiona zaczynają wschodzić po upływie około 2-3 tygodni od wysiewu. Długość procesu wschodzenia i ukorzenienia się roślin jest uzależniona od warunków pogodowych. Należy także uwzględnić, że nasiona niektórych gatunków wieloletnich zamknięte są w twardej łupinach i wschodzą po raz pierwszy dopiero wiosną w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

PIELĘGNACJA W OKRESIE WEGETACJI

Pielęgnacja w pierwszym roku po wysiewie ma decydujący wpływ na jakość ukorzeniania się i rozwoju roślin. Zawsze istnieje ryzyko pojawienia się chwastów (np. mleczy, rdest ptasi, wyczyniec polny) roznoszonych przez wiatr i ptaki, które w sprzyjających warunkach będą wschodziły wcześniej aniżeli nasiona wysianej mieszanki. W przypadku zaobserwowania obecności niepożądanego konkurencji po upływie ok. 2 miesięcy po wysiewie należy skosić lub wypalić całą powierzchnię i zabieg ten powtórzyć w zależności od potrzeb jedno- lub dwukrotnie w pierwszym roku.

Częstotliwość koszenia (pielienia) w kolejnych latach zależy od warunków siedliskowych i pożądanego typu roślinności, niemniej co do zasady należy przeprowadzać koszenie (pielenie) raz w roku pod koniec lata (sierpień-wrzesień). Dzięki stosowaniu zabiegu koszenia okrywy nasienne opadną na powierzchnię gleby zapewniając bogate plony w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Według Wytucznych FLL pielęgnacja dachu ekstensywnego dzieli się na trzy okresy:

1. Okres pielęgnacji po wykonaniu zasiewu, który obejmuje czas od wykonania dachu zielonego do momentu, w którym ponad 60% powierzchni będzie pokryte roślinnością; trwa on ok. 1 rok.
2. Okres pielęgnacji rozwijających się roślin, który kończy się gdy powierzchnia jest w 90% pokryta roślinnością; trwa on od 2 do 4 lat.
3. Okres pielęgnacji obejmujący dorosłe rośliny, który ma na celu utrzymanie ich stałego rozwoju oraz ochronę.